



- Pâte appât à base de coumatétralyl en sachet de 100 g
- Excellente appétence
- Excellente efficacité dans toutes les situations et conditions extrêmes (chaleur, humidité, moisissures, poussières)
- Homologation Biocides FR-2013-0007

Excellente appétence

Pâte ultra appétente assurant une consommation rapide par les rats et une excellente efficacité dans toutes les situations.

La matière active, le coumatétralyl, est un anticoagulant de la famille chimique des hydroxy-4-coumarines qui provoque des hémorragies internes apparaissant progressivement mais de manière fatale pour les rats. La mort survenant plusieurs jours après le début de la consommation des appâts, aucune méfiance ne se produit parmi la colonie. Racumin® Pâte permet ainsi l'élimination complète d'une population de rats.

Dose d'appâtage

Placer 1 à 2 sachets de 100 g de Racumin[®] Pâte à chaque poste d'appâtage.

Le nombre de postes d'appâtage est déterminé en fonction du site de traitement, du contexte géographique, de l'importance et de la gravité de l'infestation.

Utilisation en intérieur et autour des bâtiments privés :

- Placer un poste d'appâtage :
- tous les 5 à 20 m si faible infestation
- tous les 3 et 10 m si forte infestation
- Attendre 5 jours avant d'observer les premières consommations.
- L'effet biocide se manifeste généralement entre 3 et 15 jours après le début de l'ingestion de l'appât.
- Remettre des sachets tant que cette consommation est observée.
- A utiliser uniquement dans des boites appâts sécurisées ou dans tout dispositif assurant le même niveau de protection vis à vis de l'homme et de l'environnement.
- Inspecter et réapprovisionner les postes quelques jours après le traitement, puis une fois par semaine tant que l'appât est consommé.

Lieux d'appâtage

Racumin® Pâte est un appât universel pour tous les lieux infestés y compris les plus insalubres.

- Grâce à la sécurité de sa matière active, cette formulation est particulièrement adaptée à un usage en extérieur.
- Sa forte appétence garantit une consommation privilégiée en des lieux où se trouvent d'autres sources de nourriture pour les rats.

Poste d'appâtage

exposition répétée (catégorie 2). Dangereux.

(catégorie 4) ; Toxicité spécifique pour certains organes cibles - www.accentonic.com - 11/14 - Pub-2014-292 — SAP 8454331


AMM Blocide n° FR-2013-0007 - Composition : 0,0375% Coumatétralyl - Classement : Toxicité aiguë uutions d'emploi. Utilisez les produits biocides avec précaution. Racumin® est une marque déposée Bayer.

RACUMIN® PATE -Respecter les précau



Placer chaque poste d'appâtage sur les lieux de passage des rats ou le plus près possible de leurs terriers.

Application universelle



Peut s'utiliser en intérieur et autour des bâtiments, dans des conditions extrêmes (chaleur, humidité, moisissure, poussière)









