

# DÔME™

## TRIBOLIUM - SILVAIN - CHARANÇON

Spécial monitoring  
Piège pour la détection des coléoptères  
déprédateurs des denrées stockées

### Présentation

**TRÉCÉ® DÔME™ Tribolium - Silvain - Charançon** est un piège spécialement destiné à la capture des coléoptères dans les zones de stockage des industries du tabac, dans un but de monitoring. Le Dôme est constitué d'un réservoir surmonté d'un couvercle. Le piège, destiné à recevoir une kairomone liquide (attractif alimentaire attirant les mâles, les femelles et les jeunes) et une capsule à phéromone, est composé de deux parties distinctes : le couvercle renfermant la capsule à phéromone et le réservoir.

### Insectes à détecter / Zones d'utilisation

Les pièges **TRÉCÉ® DÔME™ Tribolium - Silvain - Charançon** sont destinés à la détection des coléoptères tels que :

- Les triboliums (*Tribolium confusum*, *Tribolium castaneum*)
- Les silvains (*Oryzaephilus sp.*)
- Les charançons (*Sitophilus sp.*)

Les pièges **TRÉCÉ® DÔME™ Tribolium - Silvain - Charançon** peuvent être utilisés dans tous les entrepôts ou locaux de stockage des denrées alimentaires (céréales, farine, grains moulus, épices, noix, pois, haricots, fruits secs, lait en poudre, cacao...)

### Pourquoi faire du monitoring ?

**Le monitoring permet :**

- de détecter toute infestation précoce
- d'endiguer une infestation avant qu'elle se propage
- d'éviter les traitements préventifs
- de consommer moins d'insecticides
- de cibler les traitements curatifs

**Dans quels cas monitorer ?**

- pour repérer toute émergence
- pendant la saison
- après un traitement insecticide

### Mode d'emploi

Retirer une capsule à phéromone de son emballage et la fixer sur l'encoche prévue à cet effet dans le couvercle du Dôme. Fixer également une pastille de kairomone (attractif alimentaire solide) dans le couvercle du Dôme. Placer enfin un disque absorbant (ou tampon) dans le réservoir et l'imbibber de quelques gouttes de kairomone liquide. Refermer le piège. Après leur avoir attribué un numéro, placer les pièges sur le sol ou sur les palettes en les espaçant de 10 à 15 mètres. Il est très important de repérer leur positionnement sur un plan du site.



- Partie granuleuse permettant aux tribolium, aux silvains et aux charançons d'atteindre l'intérieur du Dôme
- Partie lisse qui les empêche d'en ressortir

### Références et conditionnements

**Réf. I3702 :** Kit de 5 pièges complets comprenant :

- 5 dômes de captures réutilisables à souhait
- 5 sachets contenant chacun 1 capsule de phéromone (CFB/RFB) pour les triboliums
- 1 flacon de kairomone (attractif alimentaire) pour les silvains et charançons
- 10 buvards de diffusion

**Réf. I3703 :** TRÉCÉ® - Rebaït kit recharge **DÔME™ Tribolium - Silvain - Charançon**

Kit de rechargement comprenant :

- 5 sachets contenant chacun 1 capsule de phéromone (CFB/RFB) pour les triboliums
- 1 flacon de kairomone (attractif alimentaire) pour les silvains et charançons
- 10 buvards de diffusion

### Précautions d'emploi

Respecter le mode d'emploi.

Toujours maintenir les pièges fermés.

En cas de besoin, l'extérieur du Dôme peut être nettoyé avec de l'eau et du savon.

Stocker les capsules à phéromone, les pastilles de kairomone et le flacon de kairomone liquide dans leur emballage d'origine dans un endroit sec et frais (<24°C).

Pour un stockage longue durée (>1an), il est vivement recommandé de stocker les attractifs au réfrigérateur.

### Remplacement du piège

Vérifier régulièrement les pièges (1 à 2 fois par semaine) et retirer les insectes morts. Ajouter quelques gouttes de kairomone toutes les 1 à 2 semaines de façon à toujours laisser le tampon humide. Remplacer la capsule à phéromone au bout de 12 semaines et la pastille de kairomone toutes les 8 semaines.